

TABLETOMANIJA

Tabletomanija (zloupotreba lekova) je poseban problem zbog velike dostupnosti i pristupačnije cene u odnosu na ilegalne psihoaktivne supstance. Problem je velika raznovrsnost tableta koje se mogu zloupotrebljavati: benzodijazepini, barbiturati,...

Kako se unosi u organizam?

Tablete se unose gutanjem i nikako drugačije.

Lekovi protiv bolova - Trodon, Valoron, Heptanon (Metadon), Dolantin

Lekovi za smirenje i protiv nesanice - Bensedin, Bromazepan, Loram, Flormidal, Nitram, Leksilijum, Demetrin

Lekovi za lečenje Parkinsonove bolesti - Artan, Akineton

Kako deluje?

Fizički efekti:

- mlitavost skeletnih mišića
- pad krvnog pritiska
- depresija disanja
- promena metabolizma drugih supstanci u organizmu

Psihički efekti:

- osećaj umora
- poremećaj psihomotornih funkcija i koordinacije mišića
- konfuzija
- sedacija

Šta se dešava kada neko uzme lekove ?

Efekti su specifični za svaku od grupa lekova. Zajedničko im je da izazivaju jaku fizičku i psihičku zavisnost. Razvija se jaka tolerancija. Često se mešaju sa alkoholom što još više pojačava negativna dejstva i lako može dovesti do smrti.

Šta sve može da se desi?

- nesvestica zbog pada krvnog pritiska
- **smrt** usled predoziranja, u kombinaciji sa alkoholom (zbog prestanka disanja),
- **smrt** usled sedacije koja vodi ka snu, opštoj anesteziji i komi
- predoziranje zbog spore i nepredvidive brzina eliminacije iz organizma
- pogoršanje nekih, već postojećih bolesti

Veliki broj samoubistava izvrši se uzimanjem prekomerne doze lekova.